


دوز تقویت کننده به شما ایمنی بیشتری در برابر
COVID-19 از جمله Omicron می دهد.



اگر حداقل 3 ماه از اتمام دوره اولیه خود گذشته
باشد، می توانید یک تقویت کننده رایگان دریافت
کنید.



اگر تست COVID-19 شما مثبت بود حداقل 3
ماه پس از بهبودی صبر کنید تا تقویت کننده خود
را دریافت کنید.



 **Hamilton City Council**
Te kaunihera o Kirikiriroa

INTERNAL AFFAIRS

Te Tari Taiwhenua

COGS
Community Organisation
Grants Scheme



Ministry for
**Ethnic
Communities**
Te Tari Mātāwaka



**MINISTRY OF
HEALTH**

MANATŪ HAUORA



Waikato Ethnic Family Services Trust

تقویت کننده ها

تقویت کننده واکسن خود را
دریافت کنید



Unite
against
COVID-19



اگر دچار نقص ایمنی هستید:

تقویت کننده با سومین دوز اولیه توصیه شده برای افرادی که دارای نقص ایمنی هستند متفاوت است. افراد 18 ساله یا بالاتر که واجد شرایط دریافت سومین دوز اولیه هستند، می توانند 3 ماه پس از دریافت سومین دوز اولیه خود، به دوز تقویت کننده دسترسی پیدا کنند. اگر 16 یا 17 ساله هستید، باید 6 ماه صبر کنید تا بتوانید دوز تقویت کننده خود را دریافت کنید.

کدام واکسن به شما تزریق خواهد شد:

واکسن فایزر اصلی ترین واکسنی است که در نیوزلند برای تقویت کننده ها استفاده می شود، حتی اگر واکسن متفاوتی برای دوزهای قبلی خود داشته باشید. اگر 16 یا 17 ساله هستید، فقط می توانید تقویت کننده Pfizer را دریافت کنید.

یک تقویت کننده AstraZeneca اکنون 3 ماه پس از دوز دوم برای افراد بالای 18 سال در دسترس است، اما شما نیاز به نسخه دارید. شما می توانید قبل از قرار ملاقات با پزشک مورد نظر خود یا از یک کلینیک واکسیناسیون AstraZeneca نسخه دریافت کنید - اما همه کلینیک ها قادر به ارائه نسخه نیستند. مراجعه به پزشک برای نسخه تقویت کننده AstraZeneca رایگان است.

زمانی که تقویت کننده ها اجباری هستند:

دستور واکسیناسیون دریافت دوز تقویت کننده را برای کارگران در نیروهای کار حیاتی الزامی می کند.

بازه زمانی کارگران برای دریافت تقویت کننده همچنان ثابت است.

20، 7 روز هفته).

- رزرو آنلاین از طریق Book My Vaccine.
- هنگامی که برای تقویت کننده خود می رسید، تاریخ آخرین واکسیناسیون شما در ثبت واکسن کووید (CIR) بررسی می شود.

اگر باردار هستید:

اگر 16 سال یا بیشتر سن دارید، توصیه می شود واکسن فایزر را برای کمک به محافظت از خود و کودکان در برابر اثرات کووید-19 دریافت کنید.

تقویت کننده را می توان در هر مرحله از بارداری تجویز کرد. اگر 18 سال یا بیشتر دارید، می توانید حداقل 3 ماه پس از دوره اولیه خود آن را دریافت کنید (برای اکثر افراد، این 2 دوز است). اگر 16 یا 17 ساله هستید، پس از 6 ماه می توانید آن را دریافت کنید.

شما باید در مورد زمان تقویت کننده با ماما، متخصص زنان و زایمان یا پزشک عمومی صحبت کنید.

اگر تست COVID-19 شما مثبت بود:

اگر آزمایش کووید-19 شما مثبت بود اما همچنان به دوز تقویت کننده نیاز دارید، توصیه می کنیم حداقل 3 ماه پس از بهبودی برای دریافت داری تقویت کننده خود صبر کنید. در صورت ابتلا مجدد به کووید-19، 3 ماه انتظار باعث افزایش پاسخ ایمنی و محافظت بهتری می شود.

بهترین زمان برای دوز تقویت کننده ممکن است برای همه متفاوت باشد. ما به شما توصیه می کنیم قبل از دریافت تقویت کننده خود با پزشک یا Heathline به شماره

0800-358-5453 برای مشاوره صحبت کنید.

شواهد فعلی نشان می دهد که محافظت شما در برابر عفونت پس از 2 دوز به آرامی در طول زمان کاهش می یابد. دوز تقویت کننده به شما ایمنی بیشتری در برابر COVID-19 از جمله Omicron می دهد.

تقویت کننده همچنین به کاهش احتمال عفونت جدی تر کمک می کند و احتمال اینکه شما نیاز به بستری شدن داشته باشید، کمتر خواهد بود.

اکنون می توانید یک تقویت کننده رایگان دریافت کنید اگر:

- شما 18 سال یا بیشتر دارید و
- شما کاملاً واکسینه شده اید، و
- حداقل 3 ماه از اتمام دوره اولیه خود می گذرد (برای اکثر افراد، این 2 دوز است).

اگر قبلاً دوز تقویت کننده خود را با فاصله 4 ماهه رزرو کرده اید، می توانید قرار ملاقات اصلی خود را حفظ کنید یا آن را تغییر دهید.

اگر 16 یا 17 ساله هستید، اکنون می توانید یک تقویت کننده رایگان فایزر دریافت کنید اگر:

- شما کاملاً واکسینه شده اید، و
- حداقل 6 ماه از اتمام دوره اولیه می گذرد (برای اکثر افراد، این 2 دوز است).

چگونه تقویت کننده خود را دریافت کنید:

- بازدید از یک مرکز واکسیناسیون پیاده روی: یک مرکز واکسیناسیون پیدا کنید
- رزرو تلفنی: 0800-28-29-26 (8 صبح تا